

Daino (Dama dama)



Capriolo (Capreolus capreolus)

SPECIE CACCIABILI

MAMMIFERI

Daino (*Dama dama*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Corpo raccolto, occhi e orecchie grandi, arti sottili con dita mediane rivestite di zoccoli, coda piuttosto lunga. Maschi con corna che vengono annualmente rinnovate: cadono in maggio e ricrescono in luglio-agosto. Le tipiche corna a pala lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del cervo, che le ha ramificate. Mantello estivo di color fulvo-rossiccio con macchie bianche nelle parti superiori e nei fianchi, parti inferiori biancastre; di inverno più grigio con macchie meno distinte.

Lunghezza testa-corpo cm. 130-155, coda cm. 16-19, altezza al garrese cm. 80-100, lunghezza delle corna cm. 75-90, peso: maschio kg. 60-85, femmina kg. 30-50, denti 32, mammelle 4.

Predilige boschi preferibilmente di latifoglie, ma anche di conifere, ricchi di sottoboschi e radure, macchia mediterranea, incolti cespugliati.

Capriolo (*Capreolus capreolus*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Forme slanciate, testa piccola, occhi e orecchie grandi, arti snelli ma forti, dita mediane terminanti con zoccoli, coda brevissima. Maschi con corna brevi e a tre punte negli adulti, le quali vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo. Colore dominante del mantello rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti inferiori più chiare.

Lunghezza testa-corpo cm. 90-135, orecchi cm. 14-15, coda cm. 2-3, altezza al garrese cm. 66-75, lunghezza delle corna cm. 15-23, peso kg. 14-16, denti 32 (34), mammelle 4.

Predilige boschi di latifoglie e misti con radure e incolti cespugliati, macchia mediterranea. Aree di distribuzione compreso tra il livello del mare e il limite superiore della vegetazione arborea.



Mouflone (*Ovis Musimon*)



Cervo (*Cervus elaphus*)

SPECIE CACCIABILI

MAMMIFERI

Muflone (*Ovis Musimon*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Bovidi

Dimensioni medie, occhi grandi e orecchie relativamente brevi, arti sottili e robusti, dita mediane terminanti con piccoli zoccoli, coda breve. Maschi con corna perenni, robuste, non ramificate e ricurve con l'estremità rivolta in avanti. Colore dominante in estate bruno-rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, con una evidente macchia biancastra nella parte alta dei fianchi; in inverno il mantello è più scuro. Le femmine ed i giovani hanno colori più chiari tendenti al fulvo.

Lunghezza testa-corpo cm. 100-130, orecchio cm. 6,5 - 7,5, piede posteriore cm. 21,5 - 24,5, altezza al garrese cm. 65-75, peso kg 25-50, denti 32, mammelle 2. Predilige boschi, boscaglie e cespugliati di montagne scoscese e rocciose, boschi appenninici d'alto fusto, macchia mediterranea.

Cervo (*Cervus elaphus*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Cervidi

Corpo raccolto e robusto, arti slanciati, dita mediane con zoccoli stretti e allungati, coda piuttosto lunga. Maschi con corna caduche molto grandi e ramificate, che vengono annualmente rinnovate da marzo a giugno. La ramificazione delle corna lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del daino, che le ha, invece, a pala. Mantello di color bruno-rossastro in estate e più grigio-bruno in inverno, nei giovani maculato di bianco.

Lunghezza testa-corpo cm. 160-250, coda cm. 12 -15, altezza al garrese cm. 100- 150, lunghezza delle corna cm. 80-100, peso kg. 100-250, denti 34, mammelle 4.

Predilige boschi di latifoglie, conifere e misti inframmezzati da aree aperte. Nelle foreste montane si spinge fino al limite superiore della vegetazione arborea.



Alzavola (*Anas crecca*)



Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

PALMIPEDI

Alzavola (*Anas crecca*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

È la più piccola delle anatre europee. Dimensioni medie, becco più corto della testa di color grigio-nerastro, coda leggermente rotonda. La testa castano scuro con una fascia verde curva dall'occhio all'indietro, e macchie color camoscio chiaro, specchio alare verde e nero, lunga striscia bianca sulle scapolari e due macchie giallastre ai lati del sottocoda. La femmina ha tinte brunastre macchiate di scuro e specchio alare verde ben marcato.

Lunghezza totale cm. 35, ala cm. 17-19, becco cm. 3,4-3,8, coda cm. 6,2-7,2, tarso cm. 2,6-3, peso gr 250-450.

La voce è un breve krrit nel maschio, e un aspro ed acuto queck queck nella femmina.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Di grandi dimensioni, becco lungo quanto la testa, largo e appiattito, ali lunghe, coda breve e arrotondata. Il maschio ha il capo e il collo di color verde-scuro, collarino bianco, petto bruno-porporino, parti inferiori grigio-chiare, coda bianca con penne nere centrali ed arricciate; la femmina è di colore brunastro-fulvo con striature e macchie nerastre.

Lunghezza totale cm. 57, ala cm. 25-28, becco cm. 4,8-5,8, coda cm. 7,5-9,6, tarso cm. 3,6-4,6, peso gr. 700-1000.

La voce nel maschio è un calmo yeeb e nella femmina un molto sonoro qua qua.



Mestolone (*Anas clypeata*)



Moriglione (*Aythya ferina*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

PALMIPEDI

Mestolone (*Anas clypeata*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, si distingue dalle altre anatre per il becco grosso e a "spatola", coda breve e rotonda. Il maschio ha il capo color verde con riflessi metallici, petto bianco, ventre e fianchi castani, dorso bruno-scuro, specchio alare verde bordato di bianco, becco nero; la femmina è brunastra macchiata con becco bruno.

Lunghezza totale cm. 50, ala cm. 21,6-25, becco cm. 5,8-6,9, coda cm. 7,2-8,5, tarso cm. 3,2-3,8, peso: maschio gr 460-860, femmina gr 460-680.

La voce nel maschio è un profondo tak-tak, nella femmina un basso quak.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri con bassi fondali e solo occasionalmente in mare e acque salate e profonde.

Moriglione (*Aythya ferina*)


Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi


Dimensioni medio-grandi, becco nero con una striscia azzurra-pallido, ali non lunghe, coda breve rotonda. Il maschio ha testa e collo di colore castano-rossiccio uniforme, dorso e fianchi grigiastro-vermicolati, petto e sottocoda neri; la femmina è brunastro-scuro con guance e gola più chiare. Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiasta. Lunghezza totale cm. 45, ala cm. 20-22, becco cm. 5, coda cm. 4,6-5,6, tarso cm. 3,5-3,8, peso gr 750-1300.

La voce del maschio è un fischio rauco, della femmina un borbottio rauco.

Predilige specchi d'acqua aperti con fondali di media profondità, eccezionalmente in mare.



Pavoncella (*Vanellus vanellus*)



Fagiano (*Phasianus colchicus*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradriidi

Dimensioni medie, forme eleganti, ali larghe e rotonde, coda quasi quadrata, becco piuttosto breve e diritto, ciuffetto di penne sulla nuca. Piumaggio di colore neroverde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori, larga banda pettorale nera, sottocoda castano vivo.

Lunghezza totale cm. 30, ala cm. 21,6-23,4, becco cm. 2,3-2,7, coda cm. 9-10, tarso cm. 4,4-4,9, peso gr 200-220.

La voce è un forte e nasale kii-ui o kii-rr-ui

Predilige campagne coltivate umide, marcite, margini di lagune e paludi, rive dei fiumi, estuari, ecc.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Di grandi dimensioni, becco robusto, ali brevi e rotonde, coda lunga appuntita, tarso munito di sperone nel maschio. I colori del piumaggio presentano diversità nelle varie razze più o meno ibridate, che sono state liberate nel nostro Paese. I maschi hanno colori vivaci con testa verde scuro, a volte collarino bianco, piumaggio che va dal rosso-arancio al verde-scuro, caruncole scarlatte intorno agli occhi e corti ciuffi auricolari; le femmine presentano un piumaggio poco appariscente.


Lunghezza totale cm. 75-78, ala cm. 23-26, becco cm. 2,8-3,2, coda cm. 42-52, tarso cm. 6-7,8, peso: maschio gr 1200-1800, femmina gr 1000-1200.

La voce del maschio è uno stridente kok-kok.

Predilige ambienti vari, manifestando una spiccata adattabilità.



Fischione (*Anas penelope*)



Canapiglia (*Anas strepera*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

PALMIPEDI

Fischione (*Anas penelope*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, becco piccolo e stretto, coda breve e rotonda.

Il maschio si distingue per la testa color castano con fronte fulvo-giallastra, dorso e fianchi grigio-vermicolati, petto rosato, specchio alare verde e nero, sottocoda nero bordato di bianco, becco blu-lavagna; la femmina è uniformemente brunastro-rossiccia striata con ventre bianco. In volo si distinguono le zone bianche verso la parte anteriore delle ali il ventre bianco ed il sottocoda nero.

Lunghezza totale cm. 45-48, ala cm. 24-27, becco cm. 3,2-3,6, coda cm. 9,4-10,8, tarso cm. 3,4-4, peso gr 500-700.

La voce nel maschio è un fischio acuto.

Predilige specchi d'acqua costieri (estuari, lagune aperte, acque costiere salmastre), ma anche interni (laghi, stagni, paludi, fiumi).

Canapiglia (*Anas strepera*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, forme simili al Germano reale, becco più breve della testa, coda rotonda. Entrambi i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell'ala. Il maschio ha un piumaggio grigio-vermicolato sui fianchi e screziato sul capo e sul collo, petto bianco e sottocoda nero, becco color piombo con margini arancio; la femmina è brunastra macchiata di fulvo con becco scuro e margini arancioni.


La voce del maschio è una nota bassa unica

Lunghezza totale cm. 50, ala cm. 24-27, becco cm. 3,6-4,6, coda cm. 7,6-9,4, tarso cm. 3,4-4, Peso gr. 700-850.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, preferibilmente di acqua dolce; poco frequente in mare.



Starna (*Pedrix pedrix*)



Quaglia (*Coturnix coturnix*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Starna (*Perdix perdix*)

Ordine: Galliformi
Famiglia: Fasianidi

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio delle parti superiori di colore marrone striato di fulvo, fianchi barrati di castano, testa e gola castano-arancio, petto grigio vermicolato, macchia marrone a ferro di cavallo sul basso petto nel maschio molto più sviluppata, coda rossiccia. Il maschio si distingue dalla femmina per il fatto che quest'ultima ha le copritrici mediane delle ali striate trasversalmente.

Lunghezza totale cm. 30, ala cm. 15-16, becco cm. 1,3-1,6, coda cm. 7,2-8,3, tarso cm. 3,8-4,1, peso gr 380-400.

La voce è un grattante krrr-ic, o kar-uic

Predilige aree steppose e prative parzialmente boschive, anche in zone montane non troppo elevate, terreni coltivati alternati ad incolti.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Ordine: Galliformi
Famiglia: Fasianidi

Dimensioni piccole, corpo raccolto, becco breve, coda corta. Colore dominante fulvo-giallastro fortemente striato di bianco, fulvo e nero con strie chiare e scure sui fianchi, il maschio ha la gola con striature nerastre. La femmina si caratterizza per la gola bianco-fulviccia e il petto finemente macchiato di scuro. Relativamente frequenti sono gli individui melanici e isabellini.


Lunghezza totale cm. 17-18, ala cm. 10-11, becco cm. 11-12, tarso cm. 23-28, peso gr 80-100.

La voce è un ripetuto quit-quit-quit nel maschio, mentre nella femmina quip-quip.

Predilige pianure e altipiani aperti con bassa vegetazione (praterie erbose, campi coltivati a grano, foraggiere, ecc.).




Storno (*Sturnus vulgaris*)



Lupo (*Canis lupus*)



Colombaccio (*Columba palumbus*)



Tortora (*Streptopelia turtur*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Colombaccio (*Columba palumbus*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Dimensioni medie, forme pesanti e massicce, becco appuntito ricurvo all'apice e con base carnosa (cera), tarsi brevi, ali e coda piuttosto lunghe. Colore grigiobluastro con parti inferiori sfumate di rosso-vinato e collo ornato da piume a riflessi verdi e purpurei. Per la larga banda bianca attraverso le ali e le macchie bianche sul lato del collo degli adulti è facilmente riconoscibile in volo dagli altri Columbiformi. Sessi simili. Lunghezza totale cm. 40, ala cm. 23,5-25,5, becco cm. 2,1-2,5, coda cm. 14-15, tarso cm. 3-3,5, peso gr 440-580.

La voce è un profondo e sommesso tubare; una frase ripetuta di cinque note cucu-ruu, cu-cuu.

Predilige boschi di quercia, leccio, faggio, foreste con radure e zone coltivate, pinete e macchia litoranea. Frequenta anche i parchi nelle città.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi relativamente corti, ali più brevi e coda più lunga del Colombo. Colore bruno-grigiastro con petto rosso-vinato, copritrici alari fuive macchiate di nero, lati del collo barrati di bianco e nero, becco nerastro con apice giallastro e base biancastra. Sessi simili.


Lunghezza totale cm. 27, ala cm. 16-18, becco cm. 1,6-1,9, coda cm. 9,5-11, tarso cm. 2,3-2,5, peso gr 145-160.

La voce è un ripetuto turr-turr vibrante.

Predilige pianure e colline alberate, boschi intramezzati da aree coltivate, altopiani aperti con vegetazione arborea sparsa.



Storno (*Sturnus vulgaris*)



Lupo (*Canis lupus*)

SPECIE PROTETTE

UCCELLI

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Sturnidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto raccolte, becco piatto e diritto, ali lunghe e appuntite, coda breve quasi quadrata. Piumaggio di colore nerastro con riflessi metallici verdi e porporini con macchie brunastre sulle parti superiori, becco giallo; durante l'inverno nelle parti inferiori compaiono macchiette bianche e il becco assume un colore grigio-nerastro.

Lunghezza totale cm. 21, ala cm. 12-13, becco cm. 2,5-2,7, coda cm. 6,3-6,8, tarso cm. 2,7-3, peso: maschio gr 70-90, femmina gr 60-80.

La voce è un aspro, discendente tciirr.

Predilige zone coltivate di pianure e di collina ed anche di montagna, centri abitati, villaggi e cascinali.

MAMMIFERI

Lupo (*Canis lupus*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Canidi

Dimensioni medio-grandi, forme slanciate, orecchie piuttosto corte, coda relativamente breve. Colore dominante bruno-giallastro con aree fulve più scure ed estremità della coda nera.

Lunghezza testa-corpo cm. 110-140, orecchio cm. 11-13, piede posteriore cm. 22-26,5, coda cm. 30-40, altezza alla spalla cm. 70-80, peso kg 25-50, denti 42, mammelle 10.

Località boschive di pianura e di montagna, steppe e territori ad agricoltura estensiva scarsamente antropizzati.



Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)



Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Dimensioni medie, becco appuntito con alla base uno scudo che si prolunga in una placca frontale rosso brillante, ali e coda brevi e rotonde, zampe verdi, piedi con dita lunghe, munite di unghie robuste. Colore del piumaggio bruno-verdastro, con stature bianche sui fianchi, sottocoda pure bianco; solcato nel mezzo da una linea nera. Lunghezza totale cm. 32-33, ala cm. 17-19, becco cm. 2,4-2,9, coda cm. 6,5-8, Tarso cm. 4,9-5,3, peso gr 210-280.

La voce è un aspro krrr-ik o kittik.

Predilige folta vegetazione sulle rive di stagni, paludi, laghi, fiumi, canali, ecc., e praterie adiacenti più o meno umide.

Pernice rossa (*Alectoris rafa*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi



Dimensioni medie, corporatura massiccia, zampe e becco rossi, collareto nero che contorna la gola bianca, vertice castano con una lunga striscia bianca sopra l'occhio, becco tozzo, coda ed ali corte ed arrotondate, tarso provvisto di una sorta di sperone nel maschio. Parti superiori di colore bruno-olivastro, fianchi grigi barrati di bianco, nero e castano.

Lunghezza totale cm. 33-34, ala cm. 15-16, becco cm. 1,5-1,8, coda cm. 8,8-9,6, tarso cm. 4-4,4, peso gr 390-400.

La voce del maschio è un ciak ciak-er o un lento sciak-sciak, o un cac-cac.

Predilige aree aperte e cespugliate, soleggiate e a clima secco, anche in zone di montagna non molto elevate. È in genere una specie relativamente adattabile a diversi ambienti.

Airone rosso
(*Ardea purpurea* Linnaeus)



Gru (*Grus grus*)

SPECIE PROTETTE

UCCELLI TRAMPOLIERI

Airone rosso (*Ardea purpurea*)

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Ardeidi

È lungo 78 cm. Colore delle parti superiori ed ali grigio-scuro, con piume allungate color castano che pendono dal dorso. Vertice e cresta neri. Collo molto sottile e molto lungo, castano, striato di nero; centro del petto castano; resto delle parti inferiori nere. I giovani sono più "color sabbia" con vertice castano, senza nero sul capo o sul collo e con le parti inferiori fulvicce. In volo il "gomito del collo" resta più in basso e appare più angolato; i piedi e le zampe appaiono più grandi che non nell'Airone cenerino.

La voce è un frenk più acuto.

Predilige paludi, cave abbandonate, densi canneti.

Gru (*Grus grus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Gruidi

Dimensioni molto grandi, collo e zampe lunghe, becco diritto e appuntito più lungo della testa, coda breve. Piumaggio di colore grigio-scuro sfumato di bruno con coda e capo nerastri solcati da una larga banda bianca, vertice rosso. I giovani sono uniformemente di colore brunastro.

Lunghezza totale cm. 112-115, ala cm. 54-61, becco cm. 10,3-11,8, coda cm. 19-22, tarso cm. 23-25, peso gr 4100-6100.

La voce è uno stridente, trombettante kruuk ed un gutturale, più calmo kr-r-r.

Predilige zone umide, paludi boschive, praterie, steppe, rive di fiumi.



Combattente (*Philomachus pugnax*)



Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Combattente (*Philomachus pugnax*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, becco breve e sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda rotonda. Colorazione brunastro-sabbia macchiata di scuro con le parti inferiori biancastre e petto fulvo-chiaro, zampe giallastre e becco bruno-nerastro; la femmina è di minori dimensioni ma di colore del piumaggio simile a quello del maschio. Quest'ultimo, durante la stagione degli amori, si orna di un grande collare di penne a tinte variabili con combinazioni di nero, castano, bianco, bruno e crema.

Lunghezza totale cm. 29, ala: maschio cm. 18,6-19,8, femmina cm. 14,9-16,4, becco: maschio cm. 3,4-3,8, femmina cm. 2,9-3,3, coda cm. 6,1-6,8, tarso cm. 4,5-5,2, peso: maschio gr 200, femmina gr 130.

La voce è un profondo suono gutturale.

Predilige paludi, prati umidi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni più piccole del beccaccino, becco relativamente breve, coda cuneata. Colore del piumaggio brunastro con riflessi verdastri e purpurei nelle parti superiori e leggermente barrato in quelle inferiori, zampe verdastre e becco carnacino con apice scuro. Sessi simili.


Lunghezza totale cm. 19, ala cm. 10,7-11,6, becco cm. 3,9-4,1, coda cm. 4,6-5, tarso cm. 2,3-2,5, peso gr 55-90.

La voce è un curioso tambureggiamento attutito.

Predilige paludi, risaie, marcite, stagni, prati allagati, rive paludose di laghi e fiumi.



Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*)



Allocco (*Strix aluco*)

SPECIE PROTETTE

UCCELLI

Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Otididi

È lunga 42 cm.. Il maschio in piumaggio nuziale si riconosce per un grosso collare bianco e nero. Le parti superiori ed il vertice sono color sabbia caldo finemente vermicolate; la faccia è grigio blu. Parti inferiori bianche. La femmina è più pallida superiormente, striata e barrata di nero, bianco crema di sotto con i fianchi ed il petto barrati, nessuna caratteristica particolare sulla faccia o sul collo. La voce è un corto dehg e uno schioppettante ptttr. Predilige pianure erbose, grandi campi di grano, trifoglio ed altre colture.


Allocco (*Strix aluco*)

Ordine: Stringiformi

Famiglia: Strigini

È lungo 37 cm. Macchiettato e striato; testa grande e rotonda, occhi neri, senza cornetti. Parti superiori varianti dal bruno caldo al fulvo o al grigiastro. Parti inferiori bruno fulve con grosse strie scure. Dischi facciali bruno grigi.

La voce è un acuto ke-uick. Predilige boschi di una certa età, parchi, grandi giardini.



Gazza (*Pica pica*)



Cornacchia Grigia (*Corvus corone*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Gazza (*Pica pica*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

È lunga sino a 45 cm. inconfondibile per il piumaggio in cui il bianco del ventre, dei fianchi e degli scapolari contrasta con il nero del resto del corpo. La gazza vive sola o in piccoli gruppi, costituendo associazioni più numerose durante la stagione fredda. La voce è un forte rapido ciak-ciak-ciakiciak. Frequenta di preferenza i terreni aperti con qualche albero, specialmente dove vi sia abbondanza d'acqua.

Cornacchia Grigia (*Corvus corone*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

Dimensioni medio-grandi, becco grosso, robusto e ricurvo, coda mediamente arrotondata. Colore del dorso e del ventre grigio, colore del piumaggio nero. Lunghezza totale cm. 46, ala cm. 31-34,5, becco cm. 3,3-4,1, coda cm. 17,4-19,5, tarso cm. 5,4-6,4, peso gr 450-580. Predilige coltivazioni, praterie alberate, montagne.



Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)



Volpoca (*Tadorna tadorna*)

SPECIE PROTETTE

UCCELLI

LIMICOLI

Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradridi

Dimensioni medio-piccole, becco corto e diritto, coda breve e quadrata. Colore delle parti superiori del piumaggio bruno fittamente spruzzato di giallo-dorato e parti inferiori bianco-sudice in inverno; in estate le parti inferiori assumono una colorazione nera.

Lunghezza totale cm 27-28, ala cm 18-19,4, becco cm 2,1-2,5, coda cm 6-7,6, tarso cm 3,7-4,2, peso gr 200.

La voce è un chiaro e liquido tlu-i; un malinconico tliu-i e un trillo ondulato e vario che incorpora frasi ripetute: turi, turr-piu, ecc.

Predilige campi più o meno intensamente coltivati, praterie, zone costiere, margini di paludi e specchi d'acqua.

PALMIPEDI

Volpoca (*Tadorna tadorna*)


Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

E' lunga 60 cm. Si distingue per la testa ed il collo nero verde contrastanti col corpo bianco; una larga banda castana intorno alle parti anteriori ed una striscia scura lungo la linea mediana di quelle inferiori. Scapolari e remiganti primarie nere; specchio verde. Zampe rosee; becco rosso con un bitorzolo prominente nel maschio. Giovani bruno cenere di sopra, senza la banda pettorale castana, faccia e gola biancastre, becco roseo e zampe grigie. Vola come le oche, con battiti d'ala più lenti della maggior parte delle anatre.

La voce è un rapido nasale ak-ak-ak con un più profondo e sonoro ark-ark.

Predilige coste fangose e sabbiose, occasionalmente entroterra.



Lepre europea (*Lepus europaeus*)



Cinghiale (*Sus scrofa*)

SPECIE CACCIABILI

MAMMIFERI

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi

Corpo slanciato, testa piuttosto piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda relativamente sviluppata, arti posteriori notevolmente più lunghi degli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con tinte nerastre nel dorso; ventre, parti interne degli arti e parte inferiore della coda biancastre. Non esiste dimorfismo sessuale.

Lunghezza testa-corpo cm. 48-70, orecchio cm. 8,5-14, piede posteriore cm. 11-16, coda cm. 7,4-11, peso kg 2,5-6,5, denti 28, mammelle 6.

Presente pressochè dovunque, preferisce terreni pianeggianti e collinari steppici, ma si è ben adattata a zone agricole anche intensamente coltivate.

In montagna si spinge fino ad altitudini di m 2000.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Suidi


Forme massicce, testa grande, occhi piccoli, orecchie grandi e diritte con all'apice un pennello di setole. Arti relativamente brevi, quelli posteriori più corti degli anteriori. Dita provviste ciascuna di uno zoccolo. Coda corta terminante con un ciuffo di setole. Dentatura caratterizzata dallo sviluppo dei canini (zanne) che sporgono visibilmente, specie nel maschio adulto. Colore dominante bruno-nerastro e brizzolato sulle guance e sulla gola. I giovani sono di colore bruno-chiaro con strisce longitudinali bruno-scure o nerastre.

Lunghezza testa-corpo cm. 100-150, coda cm. 12-20, altezza al garrese cm. 60-90, peso: maschio kg 45-180, femmina kg 30-150, denti 44, mammelle 12.

Predilige boschi ricchi di sottobosco e macchia mediterranea, preferibilmente presso stagni, paludi, corsi d'acqua e campi coltivati.

Si spinge in montagna fino al limite della vegetazione arborea.

Cavaliere d'Italia
(*Himantopus himantopus*)



Pittima reale (*Limosa limosa*)

SPECIE PROTETTE

UCCELLI TRAMPOLIERI

Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Recurvirostridi

È lungo 37 cm. In volo, le zampe rosa grottescamente lunghe sporgono di ben 15 cm. oltre la coda. Le parti superiori nere contrastano con le inferiori bianco splendente. Il maschio, in primavera ed in estate, ha la parte posteriore del capo nera; la femmina ha il collo e il capo bianchi ed il mantello e le ali bruno scuro. I giovani e gli adulti, d'inverno, hanno dei segni scuri al capo e al collo. La superficie inferiore nera delle ali appuntite e triangolari è molto evidente in volo.

La voce è un acutissimo e guaiante kyip-kiyip-kiyip.

Predilige le paludi umide, lagune, zone allagate.

Pittima reale (*Limosa limosa*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Tringini

È lunga 40 cm. Si distingue dalla Pittima minore per il becco diritto più lungo, per le zampe molto lunghe che sporgono di parecchio dietro la coda in volo, per la grossa banda nera sulla coda bianco oro e per una larga barra alare bianca. In estate, capo e petto sono castani, fianchi e ventre bianchi con barre nerastre. Il piumaggio invernale è più simile ad una scura Pittima minore; ma il disegno delle ali e della coda sono invariati. I giovani hanno collo e petto giallastri.

La voce è un chiaro rita-rita-rita, un rapido tiu-i-tiu ed un nasale qui-it.

Predilige d'inverno, estuari e paludi; di passo, laghi interni, marcite, risaie.



Beccaccino (*Gallinago gallinago*)



Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, becco assai lungo dritto e sottile, occhi grandi, ali lunghe e puntute, coda a ventaglio con poco bianco ai lati. Piumaggio di color bruno-fulvo barrato e striato di nero, marrone e fulvo, capo nerastro solcato da una stria chiara.

Sessi simili.

Lunghezza totale cm. 26-27, ala cm. 12,8-14, becco cm. 6-7, coda cm. 5,3-6,1, tarso cm. 2,9-3,3, peso gr 100-160.

La voce è un ripetuto cic-ka.

Predilige paludi, risaie, marcite, prati allagati, rive paludose di laghi e di fiumi.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, corpo tendenzialmente tozzo, becco lungo, dritto e sottile, occhi grandi, ali, coda e tarsi relativamente brevi. Colore bruno-rossastro con notevoli variazioni individuali, becco carnacino con apice bruno-scuro. Sessi simili. Lunghezza totale cm. 34-36, ala cm. 18,5-20,5, becco cm. 6,5-7,5, coda cm. 7-8, tarso cm. 3,4-3,8, peso gr 200-400. La voce è un soffice, gracitante orrrt-orrrt, e un acuto tsiuck.

Predilige boschi umidi con sottobosco e radure sia di monte sia di piano.



Codone (*Anas acuta*)



Marzaiola (*Anas querquedula*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

PALMIPEDI

Codone (*Anas acuta*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni grandi, snella e con collo lungo, becco stretto più lungo della testa, coda nel maschio caratterizzata dalla lunghezza delle timoniere centrali. Il maschio ha il capo e il collo color bruno-cioccolato, petto bianco, fianchi e parti superiori grigiovermicolati, specchio alare verde bordato di fulvo, coda lunga appuntita e filiforme, sottocoda nero, becco bluastro-grigio con apice nero; la femmina è brunastra macchiata di fulvo e bruno, specchio alare scuro, coda appuntita e becco grigiobluastro.

Lunghezza totale cm. 55-60, ala cm. 24-28, becco cm. 4,5-5,9, coda cm. 17-20, tarso cm. 3,8-4,4, peso: maschio gr 700-1300, femmina gr 600-900.

La voce del maschio è un fischio basso, della femmina un quak basso. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, estuari, coste del mare.

Marzaiola (*Anas querquedula*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medie di poco più grandi dell'Alzavola, becco un po' più lungo della testa di colore grigio-piombo. Il maschio presenta una banda bianca che dall'occhio si estende alla nuca, petto bruno con screziature, fianchi grigio-vermicolati, ventre bianco, specchio alare verde, si riconosce in volo per la parte anteriore delle ali grigio-blu pallido; la femmina è brunastra macchiata di fulvo e bruno, con sopracciglia e guance biancastre e specchio alare verde e grigio poco distinto.

Lunghezza totale cm. 37-38, ala cm. 17,4-19,8, becco cm. 3,4-4, coda cm. 6,2-7, tarso cm. 2,6-3, peso gr 250-430.

La voce nel maschio è un krrrt, nella femmina un knèck.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, con preferenza per le acque dolci e basse.



Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)



Ghiandaia (*Garrus glandarius*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Piumaggio di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro nelle parti inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bru no-rossastra.

Lunghezza totale cm. 22, ala cm. 11-12, becco cm. 2-2,3, coda cm. 7,6-9, tarso cm. 3-3,5, peso gr 63-72.

La voce è un forte tciack o tcick ripetuto rapidamente quando è allarmato, richiamo in volo un soffice sip.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

È lunga oltre 30 cm., piumaggio di colore bruno sfumato di rosa, a eccezione della coda che è nera, del groppone e delle ali che sono parzialmente bianchi, della cresta a strisce bianche e nere, della macchia azzurra, barrata di nero, delle copritrici alari. La voce è un penetrante rauco skreek.

Frequenta, in piccoli gruppi, i boschi.



Merlo (*Turdus merula*)



Cesena (*Turdus pilaris*)

SPECIE CACCIABILI

UCCELLI

Merlo (*Turdus merala*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, becco robusto, tarsi lunghi. Il maschio ha un colore uniformemente nero con becco giallo; la femmina è bruno-nerastra con mento e gola grigiastri.

Lunghezza totale cm. 25, ala cm. 11,5-13,5, becco cm. 2,3-2,7, coda cm. 9,5-11, tarso cm. 3,2-3,4, peso gr 80-100.

La voce è uno stridente chiacchierio, quando viene fatto levare; un persistente tcinkt-cink-tcink, un ansioso tciuck, un sottile tsii.

Predilige boschi con sottoboschi e radure, campagne alberate e cespugliate, parchi e giardini delle città.

Cesena (*Turdus pilaris*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto allungate, becco robusto, tarsi lunghi. Colorazione del dorso bruno-castano, coda castana, coda e petto fulvo-rugginoso striato di scuro, testa grigio-blu, ascellari bianche, becco giallastro con apice nero; la femmina ha tinte meno forti e contrastanti.

Lunghezza totale cm. 25, ala cm. 13-15, becco cm. 2,3-2,4, coda cm. 10-11, tarso cm. 3,1-3,4, peso gr 90-100.

La voce è un aspro. chiacchierante tciack-tciack-tciack ed un calmo sii.

Predilige boschi, parchi e giardini in prossimità di praterie e pianure coltivate, frutteti.